

najčastejšie nehnojených lúkach rozličných typov, väčšinou s mierne kolísajúcou hladinou podzemnej vody, niekedy rastie v priekopách, pri brehoch vód, v okolí pramenísk, väčšinou na pôdach mierne bázických, zriedkavejšie kyslých. Vyskytuje sa roztrúsene až hojne od níziny do montánneho stupňa, vo vyšších polohách len ojedinele. Maximum: do 1600 m n. m., okr. 22, Demänovská dolina (Zahradníková-Rošetzká Biol. Pr. SAV 3/4: 32, 1957), okr. 28, 1200 m n. m., Kubínska hoľa (Hlaváček 1954 SAV). Charakteristický druh zväzu *Molinion*, vyskytuje sa však aj v iných spoločenstvách triedy *Molinio-Arrhenatheretea*.

Rozšírenie na Slovensku. Druh rozšírený takmer na celom území karpatskej i panónskej oblasti, ale nerovnako častý. Čažisko výskytu je v kolínom až submontánnom stupni. Druhu sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť, preto ani doterajšie údaje neposkytujú presný obraz o jeho skutočnom rozšírení.

Sanguisorba minor Scop.

Krvavec menší

Ic.: Tab. 10, fig. 2, p. 103

Sanguisorba minor Scop. Fl. Carn. ed. 2, p. 110, 1772.

Syn.: *Poterium sanguisorba* L. – *P. dictyocarpum* Spach – *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *dictyocarpa* (Spach) Gams – *S. minor* Scop. subsp. *minor* – *S. dictyocarpa* (Spach) Franchet

Tryáca bylina. Koreň dlhý, až 6 mm hrubý, najčastejšie zvislý, drevnatujúci, prechádza do koreňovej, niekedy rozkonárenej hlavy. Biele zdanivo terminálne, (10–)20–35(–50) cm vysoké, priame alebo krátko vystúpavé, rozkonárené, vzácnne jednoduché, ryhované, najmä v dolnej časti chlpaté. Prízemné listy stopkaté v riedkych ružiciach (3–)6–12(–20) cm dlhé, 8(–10)-jarmové. Lístky najčastjšie protistojné, vajcovito kopijovité až takmer okrúhle, (7–)10–17(–20) mm dlhé, (4–)5–15(–18) mm široké, takmer sediace až stopôčkaté (stopôčky až 4 mm dlhé), na báze klinovité až plynko vykrojené, na vrchole zaokrúhlené až tupo končisté, na okrajoch hrubo zúbkaté až pílkovité, na líci holé, tmavozelené až žltozelené, na rube holé alebo s roztrúsenými chlpami na hlavnej žile, svetlejšie ako na líci. Stopky i listové kostrnky chlpaté. Byľové listy tvarom i farbou podobné prízemným, ale menšie. Hlavky guľovité, elipsoidné až krátko valcovité, (8–)10–15(–20) mm dlhé a 8–11 (–12) mm v priemere, zväčša na dlhých konároch s vajcovitými až obrátene vajcovitými chlpatými listeňmi a listencami. V dolnej časti súkveta kvety samičie, v strednej obojphlovné, v hornej samičie. Kališné zuby vajcovité až široko vajcovité, 2,8–4 mm dlhé, tupo končisté až tupé, celistvoorajové, na okraji široko belavo lemované, v strednej časti zelené, po odkvitnutí často až sčervenene, holé, počas kvitnutia roztvorené. Tyčiniek na obojphlovných kvetoch 1–4 i viac, na